



Talon[®] Soft

Rodenticide

BRUGSANVISNINGEN

01 Produktdata

Aktiv ingrediens	Brodifacoum 0,005 %w/w (0,05 g/kg)
Præparattype	Pasta
Emballage	300 g

02 Godkendt anvendelse

Gnavermiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) og husmus (*Mus musculus*) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fungerer som kilde til rotter i bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.

03 Brugsvejledning

Rotter:	Husmus:
- Omfattende angreb: 50-200g produkt pr. Station med en afstand på 5m mellem stationerne.	- Omfattende angreb: 8g produkt pr. Station med en afstand på 5m mellem stationerne.
- Begrænset angreb: 50-200g produkt pr. Station med en afstand på 10m mellem stationerne.	- Begrænset angreb: 8g produkt pr. Station med en afstand på 10m mellem stationerne.

Brugsanvisning for brugere:

Beskyt produktet mod vejrforhold (f.eks. regn, sne mv.). Anbring foderstationerne i områder, der ikke oversvømmes.

Udskift produktet i en station, som er beskadiget af vand eller forurenet af jord.

Giftræster og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse.

Følg yderligere anvisninger i Miljøstyrelsens vejledninger. Se Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus.

Til udendørs brug skal foderstationer dækkes og placeres på strategiske steder for at minimere eksponeringen for ikke-målarter.

Læs og følg etiketten samt alle andre oplysninger, som ledsager produktet eller udleveres på salgsstedet, inden produktet tages i brug. Foretag en vurdering af skadedyrsangrebet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger inden produktet anvendes. Fjern fødevarer, som skadedyrene let kan få fat i (f.eks. spildt korn eller madaffald). Bortset fra dette skal det inficerede område ikke rengøres umiddelbart inden behandlingen, da dette kun forstyrrer skadedyrene og gør det sværere at få dem til at spise af produktet.

Produktet bør kun anvendes som led i en overordnet bekæmpelsesstrategi. Produktet bør anvendes i umiddelbar nærhed af steder, hvor der tidligere har været gnaveraktiviteter (f.eks. stier, reder, indhegninger, huller og huler mv.). Om muligt bør foderstationerne fastgøres til jorden eller andre konstruktioner. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Det anbefales at sætte bekæmpelses kontaktoplysninger på foderstationerne også. Hvis produktet anvendes på offentlige områder, bør de behandlede områder afmærkes i behandlingsperioden, og sammen med foderstationen skal der opsættes en notits om risikoen ved primær eller sekundær forgiftning med det antikoagulerende middel med angivelse af førstehjælp i tilfælde af forgiftning.

Produktet bør fastgøres, så det ikke kan trækkes væk fra foderstationen. Anbring produktet utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre dyr, som produktet ikke er rettet mod. Anbring produktet i sikker afstand af fødevarer, drikkevarer og foderstoffer samt redskaber eller overflader, som har kontakt med disse.

Hypigheden af besøg i det behandlede område bør vurderes af bekæmperen i lyset af den undersøgelse, som blev foretaget ved behandlingens start. Denne hypighed bør være i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Hvis produktet optages langsomt i forhold til angrebets tilsyneladende størrelse, overvejes det at flytte foderstationerne til andre steder og eventuelt skifte til et produkt baseret på et andet aktivstof. Hvis produktet efter en behandlingsperiode på 35 dage fortsat indtages, og der ikke observeres nogen nedgang i gnaveraktiviteten, skal den sandsynlige årsag bestemmes. Hvis andre elementer er blevet udelukket, er der sandsynligvis tale om resistens, og det bør overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere rodenticid med antikoagulerende effekt. Overvej også at bruge fælder som alternativt bekæmpelsesforanstaltning. Overvej præventive kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb.

Fjern den resterende loddemad eller loddemadsstationerne ved slutningen af behandlingsperioden. Brug en spatel til efterfyldning, samt ved rengøring/bortskaffelse af gift. På grund af den forsinkede virkningsmekanisme tager rodenticider med antikoagulerende effekt fra fire til 10 dage om at virke efter indtagelse. Gnavere kan være sygdomsbærere. Rør ikke ved døde gnavere med bare hænder; brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem.

Dette produkt indeholder et bitterstof og et farvestof.

Risiko reducerende foranstaltninger:

For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde skadedyr findes og fjernes med hyppige intervaller under bekæmpelsen i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger.

Må ikke bruges ved intervaludlægning.

Informér om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes.

Må ikke anvendes i områder, hvor der kan være mistanke om resistens over for aktivstoffet.

Produkterne må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen.

Skift ikke mellem forskellige antikoagulerende midler med sammenlignelig eller svagere styrke med henblik på resistensstyring. Ved skift mellem produkter bør det overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere antikoagulerende middel.

Vask ikke foderstationerne med vand mellem anvendelserne.

Bortskaf døde skadedyr som dagrenovation.

For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde gnavere findes og fjernes med hyppige intervaller under behandlingen (f.eks. mindst to gange om ugen).

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af [mus og rotter], såsom forebyggende brug i sikringsordninger.

Bær beskyttelseshandsker, som beskytter mod kemiske stoffer, under håndteringen af produktet (EN 374). Undgå at spise, drikke eller ryge under anvendelse af produktet.

Vask hænder og direkte eksponeret hud efter brug af produktet.

Produktet bør bekæmpe skadedyrsangrebet i løbet af 35 dage.

Såfremt brugeren efter endt behandling mistænker, at produktet ikke har været effektivt (dvs. at der stadig observeres aktiviteter fra gnavere); søg råd hos leverandøren af produktet eller tilkald en skadedyrsbekæmper.

Ikke til brug mod andre skadedyr end angivet på etiketten og ikke til anvendelse i højere doser end angivet.

04 Sikkerhedsforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Farligt for dyrelivet.

05 Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Dette produkt indeholder et antikoagulerende stof. Ved indtagelse kan der forekomme forsinkede symptomer, såsom næseblod og blødende tandkød. I svære tilfælde kan der forekomme blå mærker og blod i afføring eller urin. Modgift: K1-vitamin; må kun administreres af medicinsk/veterinært personale. Hvis produktet: **kommer på huden**, vaskes huden med vand og sæbe; **kommer i øjnene**, skylles øjnene med øjnerensvæske eller vand; hold øjnene åbne i mindst 10 minutter; **kommer i munden**, skylles munden grundigt med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Hvis produktet synkes, søges der straks lægehjælp. Vis produktets beholder eller etiketten til lægen. Kontakt en dyrlæge, hvis produktet indtages af et kæledyr.

06 Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

07 Opbevaring

Opbevares tørt og køligt på et sted med god ventilation. Hold beholderen lukket og væk fra direkte sollys. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr og husdyr.

Opbevares under lås. Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer

Holdbarhed: 12 måneder.

08 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forendes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

Mærkatr.: CLP18-095



12 x 300 g e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company