



Talon® Soft XT

Gnagergift

syngenta®

Aktive stoff(er): Brodifacoum 0,0025% w/w (0,025 g/kg)

Godkjenningnummer: NO-2019-0180-03-01

UFI: PR2W-301G-Q00T-NWQE

Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk.

Produktet skal kun utleveres til godkjente skadedyrbekjempere, ved fremvisning av sertifikat.

Bruksformål: Kun brukes som rottegift av kyndige skadedyrbekjempere. skal kun brukes til kontroll av mus og rotter, i og rundt bygninger.

Må ikke brukes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen.

Bruksanvisning, inkludert dosering og påføring: Åte klar-til-bruk, til bruk i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn/kjæledyr

Rotter (*Rattus norvegicus*):

- Omfattende angrep: opp til 200 g åte per åtestasjon, hver femte meter.

- Begrenset angrep: opp til 200g åte per åtestasjon, hver tiende meter.

Mus (*Mus Musculus*):

- Omfattende angrep: opp til 50 g åte per åtestasjon, hver femte meter.

- Begrenset angrep: opp til 50g åte per åtestasjon, hver tiende meter.

Legg ut åten hvor mus og rotter er aktive, langs spor eller i nærheten av skjulesteder. Inspiser åtesteder med passende mellomrom og etterfyll ved behov til åten ikke lenger blir spist.

Les og følg alle produktopplysninger og annen informasjon som følger med produktet eller gis på salgsstedet, før produktet tas i bruk. Før behandlingen påbegynnes skal det infiserte området undersøkes for å lokalisere bollet, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker. Fjern mat som gnagerne lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn). Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagerne slik at de ikke spiser åtet. Produktet skal kun brukes som en del av en integrert bekjempelsesstrategi der også hygienerutiner og fysisk bekjempelse inngår. Produktet bør plasseres på steder der det tidligere har vært gnageraktivitet (f.eks. stier, bol, fôrområder, hull og huler). Åtestasjoner skal festes til underlaget dersom dette er mulig. Åtestasjoner skal være tydelig merket med at de inneholder gnagergift og at de ikke skal fjernes eller åpnes. Dersom produktet brukes på offentlige steder bør de behandlede områdene merkes i behandlingsperioden. Sammen med åtestasjonen skal det settes oppslag om risikoen ved primær- eller sekundærforgiftning med et antikoagulant middel, samt en angivelse av førstehjelpstiltak ved forgiftning. Åtet må festes i åtestasjonen slik at det ikke kan flyttes av gnagerne. Plasser produktet slik at det er utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre dyr som åtet ikke er beregnet på. Ikke plasser åtet i nærheten av mat, drikke eller fôr, eller redskap/overflater som kommer i kontakt med mat, drikke eller fôr. Bruk hansker som beskytter mot kjemikalier ved håndtering av produktet (EN374). Unngå å spise, drikke eller røyke ved håndtering av produktet. Vask hender og direkte eksponert hud etter håndtering av produktet. Hyppigheten av inspeksjon av behandlede områder avgjøres av godkjent skadedyrbekjemper basert på vurderingen som ble foretatt før oppstart av bekjempelsen. Hyppigheten bør følge god etablert praksis. Dersom det spises lite av åtet sammenlignet med angrepets antatte omfang, bør det vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering. Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og gnageraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette fastslås. Dersom andre årsaker kan utelukkes er det sannsynlig at årsaken er resistens i gnagerbestanden. Det bør da vurderes å bruke et ikke-antikoagulant gnagermiddel eller hvis mulig, et sterkere antikoagulant middel. Vurder også bruk av feller som alternativ bekjempelsesstrategi. Bruk en spatel ved rengjøring/avhending av åtet etter påføring

Bruksanvisning / Tiltak for å beskytte mennesker og miljø (innendørs)

Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis. Om mulig, informer naboer og andre som kan bli berørt av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overensstemmelse med god etablert praksis]. Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagerens inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep. For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis. Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte for å hindre angrep eller for å overvåke gnageraktivitet. Bruk ikke åtet til intervallutlegging. Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres i nærheten av avløpssystem.

Bruksanvisning / Tiltak for å beskytte mennesker og miljø (utendørs rundt bygninger)

Beskytt åtet mot været. Plasser åtestasjonene på steder som ikke oversvømmes. Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset av jord. Fjern resterende åte når bekjempelsen avsluttes. Følg eventuell ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis. Om mulig, informer naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter [i overensstemmelse med god etablert praksis]. Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagerens inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep. For å redusere risiko for sekundærforgiftning må døde gnagere fjernes regelmessig mens bekjempelsen pågår etter intervaller i tråd med god etablert praksis. Bruk ikke antikoagulanter som permanent åte for å hindre angrep eller for å overvåke gnageraktivitet. Bruk ikke åtet til intervallutlegging. Bruk ikke dette produktet direkte på bol. Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres nær overflatevann (f.eks. elver, dammer, kanaler, diker eller grøfter) eller avløpssystemer.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og vekk fra direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr. Holdbarhet: 2 år

Annen informasjon

På grunn av den forsinkede virkemekanismen tar det 4-10 dager etter inntak av det antikoagulante rodenticidet for å oppnå effekt. Gnagere kan være sykdomsbærere. Berør ikke døde gnagere med bare hender; bruk hansker eller redskap som f.eks. tang eller klype til å fjerne dem. Dette produktet inneholder et bitterstoff og et fargestoff.

Produktets partinummer og siste bruksdato: se pakning.

Innehaver av godkjenningen i Norge: Rentokil Initial Limited, Hazel House Millennium Park, Naas, Irland

Importør/Representant: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark. Tel. +45 32 87 11 00

CLP20-038A

Innhold: 300 G e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company