

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plaît avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

BASE

NON-PRINTABLE

DESCRIPTION:
BOOKLET 4-16 PG 200 X 100 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN001

ISSUE DATE:
06.06.2014

4039155

L1063568 SAUDI/06Y PPE 4122784

Talon® Waxblocks

syngenta.

تالون® مكعبات شمعية طعوم قوارض

مبيد قوارض طعوم جاهزة للإستخدام
على هيئة مكعبات شمعية لمكافحة القوارض

مبيد آفات صحة عامة

يستخدم من قبل المختصين

يحفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال

Syngenta Crop Protection, LLC
410 Swing Road, P.O. Box 18300
Greensboro, NC 274198300

الشركة المنتجة: شركة سينجنتا
بلد الإنتاج: هنغاريا

2.5 KG

٢,٥ كجم

المادة الفعالة: بروديفاكوم ٠,٠٠٥ % (و/و)
مادة مضافة: ديناتونيوم بنزوات ٠,٠٠١ % (و/و)
المواد المضافة: ٩٩,٩٩٤ %
المجموع: ١٠٠ %
Inert Ingredient: Denatonium Benzoate 0.001% (W/W)
Inert Ingredients: 99.994%
Total: 100%

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: ١٣٤٢ - ١٢ - ١٥٧

FRONT PAGE



الوكيل: شركة الآلات والمواد الزراعية المحدودة
الرقم الموحد جدة: ١١١٢٣ / ٩٢٠٠١١٢٣ ص.ب ١١٢١٨ جدة ٢١٤٥٣
جدة هاتف: ٦٥٢٤٣٢٥ / ٦٥٢٤٧١ / ٦٥٢٠٥٧٦ فاكس: (٠١٢)
الفروع:

Batch No.: انظر الي الغتم
رقم الدفعة:
Production date: المطبوع على العبوة
تاريخ الانتاج:
Expiry date: سنتين من تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء:

بريدة هاتف: ٣٢٤٩٩٣٢ (٠١٦) ص.ب ١١٩٨
الخرج هاتف: ٥٥٠١٦٨٧ (٠١١) ص.ب ١٥٤١
الرياض هاتف: ٤٧٦٨٤٣٠ (٠١١) ص.ب ١٩٤٨٦

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company



DESCRIPTION:
BOOKLET 4-16 PG 200 X 100 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN001

ISSUE DATE:
06.06.2014

4039155

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد:

يجب عدم إعادة استخدام العبوات الفارغة لأي عرض كان. ويتم التخلص من العبوات الفارغة وبقايا المبيد حسب اللوائح المحلية المتبعة وعبر الشركات المرخصة والمسؤولة عن التخلص من عبوات وبقايا المبيدات.

احتياطات السلامة:

- 1- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة المعلومات بدقة.
- 2- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أقنعة) عند خلط أو استعمال المبيد.
- 3- تجنب التطبيق أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء هطول الأمطار.
- 4- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- 5- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استعمال المبيد.
- 6- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- 7- المبيد يسبب حساسية عند ملامسته للجلد والعيون.
- 8- لا يجوز استخدام المبيد مباشرة على خزانات أو أحواض المياه المعاملة المخصصة للشرب، أو الأدوات المخصصة للشرب.
- 9- يجب وضع علامة تحذيرية تفيد بأن الموقع تحت المعاملة لمكافحة القوارض. يجب إبعاد الأطفال والحوامل والأشخاص الغريباء والحيوانات الداجنة والأليفة عن الأماكن المعاملة.
- 10- سام للحياة البرية والثدييات والطيور.
- 11- عدم تطبيق المبيد بالقرب من المناحل وأماكن تربية الأسماك حيث أن المبيد سام للنحل والأسماك.
- 12- سام جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد، ويسبب آثار سلبية للحياة المائية على المدى الطويل.

الإسعافات الأولية:

- عند البلع: يغسل فم المصاب بالماء ولا يجبر على التقيؤ، ويجب مراجعة الطبيب فوراً وتزويده بملصق عبوة المبيد ونشرة السلامة الفنية (MSDS).
 - عند الاستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق بعيداً عن مكان التلوث ومراجعة الطبيب فوراً.
 - عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجلد جيداً بالماء والصابون. وفي حال تهيج الجلد، يجب مراجعة الطبيب فوراً.
 - عند ملامسة العين: الغسيل الجيد بالماء النظيف لمدة 15-20 دقيقة ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
 - أعراض التسمم: قد يسبب حساسية للجلد والعيون، نزيف الدم.
 - مضاد التسمم: فيتامين ك 1 Vitamin K فإيتوميناديون Phytomenadione تحت إشراف طبي.
 - نصيحة للأطباء: إن دايفيناكوم هي مادة مانعة لتخثر الدم، حيث تمنع عمل فيتامين ك 1 مما يسبب النزيف. يجب تحديد بروثرومبين Prothrompin time لمدة 18 ساعة على الأقل بعد تعرض المصاب للمبيد، إذا ارتفعت، يعطى المصاب فيتامين ك 1 (فإيتوميناديون) حتى تعود إلى الحالة الطبيعية. يجب تحديد Prothrompin time لمدة أسبوعين بعد التوقف عن إعطاء فيتامين ك 1 ومعاودة العلاج إذا حدث الارتفاع مجدداً.
- في حالة نشوب حريق
- 1- تفعيل أنظمة الحريق وإبلاغ الجهات المختصة بالحريق.
 - 2- أبعد مصادر الاشتعال
 - 3- احتواء الحريق قدر المستطاع وعدم المخاطرة بإطفاء الحريق.
 - 4- بعد إطفاء الحريق، قم بخطوات معالجة التسرب.
- الضمان:
- تضمن الشركة المنتجة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية أي أضرار تنتج من سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين

الخواص:

تألون مكعبات شمعية طعوم قوارض مخضرا على صورة مكعبات شمعية، يحتوي على المادة الفعالة بروديفاكوم المانع لتخثر الدم، يتبع للمجموعة الكيميائية هيدروكسي كومارين، مخصص للقضاء على القوارض في الداخل والخارج. قاتل بجرعة واحدة بعد مرور 4-5 أيام من تناول الطعم حتى لا تتخوف القوارض من تناول الطعم. يحتوي على مادة ديناتونيوم ذات المرارة العالية للتقليل من خطورة تسمم الأطفال والحيوانات الأليفة.

تعليمات الاستخدام:

- قبل توزيع الطعوم يجب عمل كشف فعلي للمنطقة المصابة من أجل تحديد موقع دخول الآفة، الجحور، موقع الغذاء المتوفر، أماكن تجمع النفايات، المناور، وجود ثقب في الجدران والأرضيات وغيرها، وذلك من أجل إزالة مثل هذه الأسباب خاصة التخلص من النفايات والمحافظة على نظافة الموقع.
- 1- اختيار نقاط توزيع الطعوم مثل الفتحات، الثقب، تحت أكوام النفايات والزوايا المعتمة.
 - 2- تأسيس خط لتوزيع الطعوم ما بين أماكن المعيشة ومناطق الغذاء المتوفرة للقوارض.
 - 3- يتم توزيع الطعوم على مسافة خمسة أمتار بين الطعم والآخر.
 - 4- يتم توزيع الطعوم في مناطق النشاط وبالتحديد في أماكن مشاهدة الفضلات.
 - 5- في المنازل والأماكن المأهولة يتم توزيع الطعوم بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
 - 6- افحص المكان بشكل يومي وقم بزيادة الطعوم في حالة استهلاكها بالكامل وتخلص من القوارض الميتة، واستبدل الطعوم المستهلكة أو التي تضررت وازالتها بعد التأكد من القضاء على الآفة تماماً.
 - 7- استخدم القفازات عند وضع الطعوم وعدم لمس الطعوم باليدين كي لا تتخوف الفئران من تناول الطعوم كونها تشتم الرائحة.

معدلات الاستخدام:

يتم توزيع الطعوم في الأماكن الرطبة والجافة مثل البالوعات، القنوات المستودعات والأماكن المأهولة، بعيداً عن تناول الأطفال والحيوانات الأليفة وبالمعدلات التالية:

الآفة	مستوى الإصابة	نقاط توزيع الطعوم	إعادة التطبيق
الجرذان	إصابة منخفضة	٢٠-٦٠ غم كل ١٠م	إجراء الفحص على الطعوم بعد أسبوع من التطبيق الأول ثم كل أسبوعين
	إصابة عالية	٢٠-٦٠ غم كل ٥م	إجراء الفحص على الطعوم بعد ٣ أيام من التطبيق الأول ثم كل أسبوع أو أسبوعين
الفئران	إصابة منخفضة	٢٠ غم كل ٥م	إجراء الفحص على الطعوم بعد أسبوع من التطبيق الأول ثم كل أسبوعين
	إصابة عالية	٢٠ غم كل ٢م	إجراء الفحص على الطعوم بعد ٣ أيام من التطبيق الأول ثم كل أسبوع أو أسبوعين

* استبدل الطعوم بأخرى جديدة إذا كانت الطعوم القديمة مأكولة جزئياً، وضاعف عدد الطعوم إذا كانت الطعوم مأكولة كلياً وذلك في كل عملية فحص للطعوم.

التخزين:

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المغلقة داخل مكان جاف، بارد، جيد التهوية، بعيداً عن تناول الأطفال وبعيداً عن الأطعمة والأعلاف ومياه الشرب والأواني المنزلية وأماكن تربية الحيوانات.

NO TEXT HERE

GLUE PAGE

PAGE NUMBER SEQUENCING IS DETERMINED BY THE FINAL LEADING EDGE.
RIGHT HAND STARTS FROM BACK OF BOOKLET. LEFT HAND STARTS FROM FRONT OF BOOKLET.
FIRST (FRONT) PAGE IS ALWAYS FIXED ON TOP OF BOOKLET.