



Talon® Soft XT

Rodenticid

BRUGSANVISNINGEN

01 PRODUKTDATA

Aktiv ingrediens: Brodifacoum 0,0025% w/w (0,025 g/kg)
 Præparattype: Pasta
 Emballage: 300g

02 GODKENDT ANVENDELSE

Gnavermiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) og husmus (*Mus musculus*) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fungerer som kilde til rotter i bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.

03 BRUGSVEJLEDNING

Rotter:	Husmus:
- Omfattende angreb: Op til 200g produkt pr. Station med en afstand 5m fra hinanden. - Begrænset angreb: Op til 200g produkt pr. Station med en afstand 10m fra hinanden.	- Omfattende angreb: Op til 50g produkt pr. Station med en afstand 5m fra hinanden. - Begrænset angreb: Op til 50g produkt pr. Station med en afstand 10m fra hinanden.

Brugsanvisning for brugere:

Indendørs: Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Følg eventuelle yderligere anvisninger i Miljøstyrelsens vejledninger. Informer om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes [i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger]. Overvej forebyggende kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb. For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde skadedyr findes og fjernes med hyppige intervaller under bekæmpelsen i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Overvej præventive kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb. For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde gnavere findes og fjernes med hyppige intervaller under bekæmpelsen i overensstemmelse med anbefalingerne i Vejledningen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af [mus og rotter], såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Må ikke bruges ved intervaludlægning. Ved anbringelse af foderstationer tæt på afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.

Udendørs omkring bygninger: Beskyt produktet mod vejforhold. Anbring foderstationerne i områder, der ikke oversvømmes. Udskift produktet i stationer, som er beskadiget af vand eller forurenset af jord. Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Følg yderligere anvisninger i Miljøstyrelsens vejledninger. Informer om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes [i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger]. Overvej præventive kontrolforanstaltninger (tilstop huller, og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge indtagelsen af produktet og mindske sandsynligheden for nye angreb. For at mindske risikoen for sekundær forgiftning skal døde gnavere findes og fjernes med hyppige intervaller under bekæmpelsen i overensstemmelse med anbefalingerne i Vejledningen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af [mus og rotter], såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Må ikke bruges ved intervaludlægning. Anvend ikke dette produkt direkte i rottegange. Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.

Læs og følg etiketten samt alle andre oplysninger, som ledsager produktet eller udleveres på salgstedet, inden produktet tages i brug. Foretag en vurdering af skadedyrsangrebet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger inden produktet anvendes. Fjern fodevarer, som skadedyrene let kan få fat i (f.eks. spildt korn eller madaffald). Bortset fra dette skal det inficerede område ikke rengøres umiddelbart inden behandlingen, da dette kun forstyrrer skadedyrene og gør det sværere at få dem til at spise af produktet. Produktet bør kun anvendes som led i en overordnet bekæmpelsesstrategi. Produktet bør anbringes i umiddelbar nærhed af steder, hvor der tidligere har været gnaveraktiviteter (f.eks. stier, reder, indhegninger, huller og huler mv.). Om muligt bør foderstationerne fastgøres til jorden eller andre konstruktioner. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører bekæmpelsen. Hvis produktet anvendes på offentlige områder, bør de behandlede områder afmærkes i behandlingsperioden, og sammen med foderstationen skal der opsættes en notits om risikoen ved primær eller sekundær forgiftning med det antikoagulerende middel med angivelse af førstehjælp i tilfælde af forgiftning. Produktet bør fastgøres, så det ikke kan trækkes væk fra foderstationen. Anbring produktet utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre dyr, som produktet ikke er rettet mod. Anbring produktet i sikker afstand af fodevarer, drikkevarer og foderstoffer samt redskaber eller overflader, som har kontakt med disse. Bær beskyttelseshandsker, som beskytter mod kemiske stoffer, under håndteringen af produktet (EN374). Undgå at spise, drikke eller ryge under anvendelse af produktet. Vask hænder og direkte eksponeret hud efter brug af produktet. Hyppigheden af besøg i det behandlede område bør vurderes af bekæmperen i lyset af den undersøgelse, som blev foretaget ved behandlingens start. Denne hyppighed bør være i overensstemmelse med anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledninger. Hvis produktet optages langsomt i forhold til angrebets tilsyneladende størrelse, overvejes det at flytte foderstationerne til andre steder og eventuelt skifte til et produkt baseret på et andet aktivstof. Hvis produktet efter en behandlingsperiode på 35 dage fortsat indtages, og der ikke observeres nogen nedgang i gnaveraktiviteten, skal den sandsynlige årsag bestemmes.

Hvis andre elementer er blevet udelukket, er der sandsynligvis tale om resistens, og det bør overvejes at anvende et ikke-antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere rodenticid med antikoagulerende effekt. Overvej også at bruge fælder som alternativ bekæmpelsesforanstaltning. Brug en spatel til efterpårning (rengøring / bortskaffelse) af agn.

På grund af den forsinkede virkningsmekanisme tager rodenticider med antikoagulerende effekt fra fire til 10 dage om at virke efter indtagelse. Gnavere kan være sygdomsbærere. Rør ikke ved døde gnavere med bare hænder; brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem. Dette produkt indeholder et bitterstof og et farvestof.

RISIKO REDUCERENDE FORANSTALTNINGER: Informer om muligt eventuelle brugere af det behandlede område og omgivelser om bekæmpelsen inden den indledes [i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger]. Produktplysningerne (dvs. etiket og/eller brugsvejledning) skal tydeligt vise, at produktet kun må udleveres til autoriserede rottebekæmpere, der dokumenterer, at de gældende uddannelseskrav er opfyldt. Må ikke anvendes i områder, hvor der kan være mistanke om resistens over for aktivstoffet. Produkterne må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen. Skift ikke mellem forskellige antikoagulerende midler med sammenlignelig eller svagere styrke med henblik på resistensstyring. Ved skift mellem produkter bør det overvejes at anvende et ikke antikoagulerende rodenticid, hvor dette er muligt, eller et stærkere antikoagulerende middel. Vask ikke foderstationer eller redskaber med vand mellem anvendelserne. Bortskaf døde skadedyr som dagrenovation.

04 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer. Farligt for dyrelivet.

05 FØRSTEHJÆLP

Dette produkt indeholder et antikoagulerende stof. Ved indtagelse kan der forekomme forsinkede symptomer, såsom næseblod og blodende tandkød. I svære tilfælde kan der forekomme blå mærker og blod i afføring eller urin. Modgift: K1-vitamin; må kun administreres af medicinsk/veterinært personale. Hvis produktet kommer på huden, vaskes huden med vand og sæbe. Kommer i øjnene, skylles øjnene med øjenrenssevæske eller vand; hold øjnene åbne i mindst 10 minutter. Kommer i munden, skylles munden grundigt med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Hvis produktet synkes, søges der straks lægehjælp. Vis produktets beholder eller etiketten til lægen. Hvis et dyr uden for målgruppen indtager produktet, ring til en dyrlæge.

06 BORTSKAFFELSE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

07 OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt på et sted med god ventilation. Hold beholderen lukket og væk fra direkte sollys. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr og husdyr. Opbevares under lås. Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. Holdbarhed: 24 måneder.

08 AT BEMÆRKE

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forendes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

Mærkatnr.: CLP21-054A

12 x 300 g e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company