



Advion® Cockroach Gel


INSEKTMIDDEL

For innendørs og utendørs bruk som sprekke-, spalte- og flekkbehandling kun i og rundt hjem, industrianlegg, kontorer, varehus, storkjøkken, sykehus, skoler, sykehjem, hoteller, busser, tog, flybutikker og kommersielle virksomheter til bekjempelse kakerlakker og innendørs bruk (kun for overflater) til bekjempelse av sølvkre og skjeggkre. Kun for profesjonell bruk.

Må ikke brukes til andre formål eller i høyere doseringer enn angitt i bruksanvisningen.

Les vedlagte bruksanvisning før bruk.

| | |
|--|--|
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| EUH208 | Inneholder indoksalcarb. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| P273 | Unngå utslipp til miljøet. |
| P501 | Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. |
| Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). | |
| Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). | |

Sammensetning: 0,6% indoksalcarb

Godkjenningsnummer: NO-2015-0103

Produkttype: PT18- Insecticides, repellents and products for control of other arthropods (pest control)

Formulering: Åte (klar til bruk) (RB)

Brukerkategori: Utdannet profesjonell

Tilvirker: Syngenta Crop Protection AG, CH-4058 Basel, Sveits

Importør: Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S (Danmark) Tel. +45 32 87 11 00

Nettoindhold: 4 x 30 G

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE OG VIRKEOMRÅDE

For innendørs og utendørs bruk som sprekke-, spalte- og flekkbehandling kun i og rundt hjem, industrianlegg, kontorer, varehus, storkjøkken, sykehus, skoler, sykehjem, hoteller, busser, tog, flybutikker og kommersielle virksomheter til bekjempelse kakerlakker og innendørs bruk (kun for overflater) til bekjempelse av sølvkre og skjeggkre. Kun for profesjonell bruk.

Advion® Cockroach gel bekjemper:

- Amerikansk kakerlakk (*Periplaneta americana*): Voksne og nymfer
- Tysk kakerlakk (*Blattella germanica*): Voksne og nymfer
- Orientalisk kakerlakk (*Blatta orientalis*): Voksne og nymfer
- Sølvkre (*Lepisma saccharina*): Voksne og umodne
- Skjeggkre (*Ctenolepisma longicaudata*): Voksne og umodne

BRUKSRETTELING

Kun for godkjente skadedyrbekjempere.

Følg bruksanvisningen.

Ikke eksponer åtedråper for sollys eller varme (f.eks. radiator).

Før behandling, fjern alle naturlige matkilder fra det infiserte området for å oppmuntre til inntak av gelen.

Dosering: 0,2 til 0,5 g/m², med et maksimalt antall på 11 påføringer per år.

KAKERLAKKER:

Påfør minimum 2 flekker gel per m².

Et økt antall gelflekker (opptil 5 per m²) kan være nødvendig ved tilfeller av kraftig kakerlakkangrep, ekstremt skitne forhold, eller der hvor orientalske kakerlakker og amerikanske kakerlakker dominerer.

Vanligvis bør åteplasseringer inspiseres på nytt hver 7-14 dag, og åte påføres på nytt etter behov.

SØLVKRE OG SKJEGGKRE:

Påfør mellom 0,2 g (2 flekker med diameter på 5 mm) og opptil 0,5 g (5 flekker med diameter på 5 mm eller 1 flekk med diameter på 10 mm) gel per m², eller påfør en enkelt tynn geldråpe med lengde på opptil 5 cm per m².

Øk påføringsmengden med opptil 0,5 g/m² avhengig av angrepets alvorlighetsgrad og arter som er tilstede.

Før påføring i en åtestasjon: påfør minimum 0,2 g og opptil 0,5 g/m² gel i kammeret på åtestasjoner. Øk påføringsmengden opptil 0,5 g/m² avhengig av angrepets alvorlighetsgrad. Vanligvis bør åteplasseringer inspiseres på nytt hver 7-14 dag og åte påføres på nytt etter behov.

Fortynning (%): 0,0

Merk:

- Flekkstørrelse på 5 mm i diameter veier omtrent 0,1 g
- Flekkstørrelse på 10 mm i diameter veier ca. 0,5 g
- Tynn dråpe som er 5 cm lang og 3 mm bred veier omtrent 0,35 g

Metode:

KAKERLAKKER: Åtebehandling

Åtestasjon. Flekkpåføring (overflater, sprekker og spalter). Gelen påføres med en åtepestol som kan utstyres med forskjellige dispenserdyser for å dispensere flekker eller dråper i forskjellige størrelser. Påføring på næringsmiddel-/fôrområder hos bedrifter som håndterer næringsmidler utføres ved sprekke- og spaltebehandling.

SØLVKRE OF SKJEGGKRE: Åtebehandling of dråper av gel kun på overflater

RESISTENS

- Ta i bruk integrerte skadedyrbekjempelsesmetoder som f.eks. en kombinasjon av kjemiske, fysiske bekjempelsesmetoder og andre folkehelseiltak. Ta også hensyn til lokale spesifikke forhold (klimaforhold, målorganismer, bruksforhold osv.).
- Veksle mellom produkter med ulike aktive stoffer og virkemåte (for å fjerne resistente individer fra populasjonen).
- Ikke bruk produktet i områder der det er mistanke om eller etablert resistens mot virkestoffet i dette produktet.
- Informer godkjenningssinnhaver dersom behandlingen er ineffektiv.

FORSIKTIGHETSREGLER

BESKYTTELSESTILTAK:

- Påfør produktet i områder som er utilgjengelige for våt vask eller utvasking av regn eller rundt avløp.
- Bruk kun i områder som er utilgjengelige for spedbarn, barn, husdyr og dyr som ikke er mål-organismen.
- Må ikke påføres i områder der mat/fôr, matredskaper eller matforberedende overflater kan komme i kontakt med eller være forurenset av produktet.
- Bruk verneutstyr for å unngå kontakt med hud og øyne.
- Rengjør spissene med papirhåndkle etter hver behandling og kast brukte papirhåndklær på et godkjent avfallsmottak.

DETALJER OM SANNSYNLIGE DIREKTE ELLER INDIREKTE EFFEKTER, FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONER OG NØDTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØET:

For å begrense miljøforurensning, påfør maksimalt én gang i måneden uten å overstige elleve påføringer i året.

FØRSTEHJELP:

- **Innånding:** Flytt den tilskadekomne til frisk luft og la hvile i en stilling som letter åndedrettet. Oppsøk lege umiddelbart hvis symptomer oppstår og/eller store mengder har blitt inhalert.
- **Hudkontakt:** Fjern forurensete klær og sko. Vask forurenset hud med såpe og vann. Kontakt giftinformasjonen hvis det oppstår symptomer.
- **Øyekontakt:** Skyll umiddelbart med mye vann, løft av og til øvre og nedre øyelokk. Se etter og fjern eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle med lunkent vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege hvis det oppstår irritasjon eller synsforstyrrelser.
- **Svelging:** Skyll munnen med vann. Kontakt giftinformasjonen. Oppsøk lege umiddelbart hvis symptomer oppstår og/eller store mengder er inntatt.
- Ved nedsatt bevissthet plasser i stabilt sideleie og oppsøk lege umiddelbart. Ikke gi væske eller fremkall brekninger.
- Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13

AVFALLSHÅNDTERING

- Kast de ferdigfylte plastpatronrørene, åteboksene og emballasjen til et godkjent avfallsmottak ved slutten av behandlingen.
- Tørk opp produktsøl eller overflødig produkt ved slutten av behandlingen med papirhåndklær og kast brukte papirhåndklær på et godkjent avfallsmottak.
- Ikke rengjør de ferdigfylte plastpatronrørene og åteboksene mellom påføringene.
- Ikke fyll på eller bruk åtedispenseren på nytt; tomme dispensere må avhendes på en sikker måte under innehaverens ansvar.
- Ikke tøm ubrukt produkt på bakken, i vannløp, i rør (vask, toaletter...) eller i avløp.
- Kast ubrukt produkt, dets emballasje og alt annet avfall i samsvar med lokale forskrifter.

LAGRING

Holdbarhet: 3 år

Beskyttes mot lys. Beskyttes mot frost.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.