



# Advion<sup>®</sup> Cockroach

## Gel

### INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner og sprækker eller som spotbehandling og mod sølvfisk og skægget sølvkræ som spotbehandling.

Må kun anvendes indendørs og kun af professionelle skadedyrsbekæmpere.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

#### FORSIGTIG

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Undgå udledning til miljøet (P273).

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

Vask huden efter arbejdet.

Overtredelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner og sprækker eller som spotbehandling og mod sølvfisk og skægget sølvkræ som spotbehandling. Må kun anvendes indendørs og kun af professionelle skadedyrsbekæmpere. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**På grund af en risiko for forgiftning ved indtagelse, må produktet ikke anvendes i områder hvor børn, husdyr samt vilde dyr kan få adgang.**

**Må ikke bruges i eller omkring afløb.**

**Må ikke tømmes i kloak afløb.**

**Tør overskydende og spildt gel op med tør klud, der bortskaffes med dagrenovationen.**

**Må ikke bruges på områder, der rengøres med vand, da det vil fjerne gelen.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurennes.**

**Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.**

**FØRSTEHJÆLP:** Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller der er blevet inhaleret store mængder. Hudkontakt: Fjern forurennet tøj og sko. Vask forurennet hud med sæbe og vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved. Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis de øvre og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunken vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller synsedsættelse. Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt GIFTLINIEN. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller der er indtaget store mængder. I tilfælde af mistet bevidsthed: Placer den berørte i stabil sideleje, og søg lægehjælp omgående. Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning. Sørg for, at beholderen eller etiketten er tilgængelig.

Notdtefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

**Nettoindhold:** 4 x 30 g

Insektmiddel BPR-reg. nr. 1-258. Aktivstof indoxacarb og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). PR Nr. 4426173

Indeholder indoxacarb. Kan udløse allergisk reaktion.

**Indeholder:** Indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25) 1,28 % w/w (14,29 g/L), der svarer til 0,6 % w/w (6,7 g/L) aktiv indoxacarb isomer.

**Præparattype:** Gel

**Batch nr.:** Se emballagen.

**Produktionsdato:** Se emballagen.

**Udløbsdato:** 3 år efter produktionsdato.

**Godkendelsesindehaver:** Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S Danmark Tel: +45 32 87 11 00

### BRUGSANVISNING

Må kun anvendes som insektmiddel mod kakerlakker i revner og sprækker eller som spotbehandling og mod sølvfisk og skægget sølvkræ som spotbehandling. Må kun anvendes indendørs og kun af professionelle skadedyrsbekæmpere.

- Kun til professionel brug.
- Overhold brugsanvisningen.
- Udsæt ikke lokkemad for sollys eller varme (som fx radiator).
- Før behandlingen skal du fjerne alle naturlige fødeklider fra det angrebne område for at fremme indtagelsen af gelen.
- Påfør produktet i områder, hvor der ikke bliver vådt eller sker udvaskning af regn og ikke i eller omkring afløb.
- Placer kun lokkemadstationer i områder, der er utilgængelige for spædbørn, børn, kæledyr og ikke-måldyr.
- Må ikke påføres steder, hvor fødevarer/foder, redskaber eller overflader til fødevarerforarbejdning kan komme i kontakt med/blive forurennet af produktet.
- Brug værnemidler for at undgå kontakt med hud og øjne.

Advion<sup>®</sup>Cockroach Gel bekæmper kakerlakker, herunder:

- Amerikansk kakerlak (*Periplaneta americana*): Voksne og nymfer
- Tysk kakerlak (*Blattella germanica*): Voksne og nymfer
- Orientalisk kakerlak (*Blatta orientalis*): Voksne og nymfer

Anvendelsesområde: Kun til brug indendørs som revne-, sprække- og pletbehandling og kun i og omkring boliger, industrifaciliteter, kontorer, lagerbygninger, storkøkkener, hospitaler, skoler, plejehjem, hoteller, busser, tog, fly, detailhandel og kommercielle virksomheder.

Metode: Påføring af lokkemad. Lokkemadsstation eller pletpåføring (overflader, revner og sprækker).

Gelen påføres med en applikator, der kan forsynes med forskellige dyser til påføring af pletter eller perler i forskellige størrelser. Påføring i fødevarer- eller foderområder hos virksomheder, der håndterer fødevarer og foder, må kun ske i revner og sprækker.

Advion<sup>®</sup>Cockroach Gel bekæmper sølvkræ, herunder:

- Almindelig sølvkræ (*Lepisma saccharina*): Voksne og umodne
- Skægget sølvkræ (*Ctenolepisma longicaudata*): Voksne og umodne

Anvendelsesområde: Indendørs (Kun overflade)

Metode: Påføring af lokkemad. Dråber af gel, kun på overflade

#### PÅFØRINGSRATE OG HYPPIGHED

Påføringsrate: 0,2-0,5 g/m<sup>2</sup>, maksimalt 11 påføringer/år.

Bemærk:

En dråbestørrelse på 5 mm i diameter vejer cirka 0,1 g.

En dråbestørrelse på 10 mm i diameter vejer cirka 0,5 g.

En tynd dråbe, 5 cm lang og 3 mm bred, vejer cirka 0,35 g.

**Kakerlakker:** Påfør minimum 2 pletter gel pr. m<sup>2</sup>. Et øget antal gelletter (op til 5 pr. m<sup>2</sup>) kan være påkrævet under forhold med stor forekomst af kakerlakker, ekstremt snævsede forhold, eller hvor orientalske og amerikanske kakerlakker dominerer. Typisk skal lokkemadsstationer efterses hver 7.-14. dag for forbrug og for evt. genopfyldning om nødvendigt.

**Sølvkræ:** Påfør mellem 0,2 g (2 pletter, 5 mm i diameter) og op til 0,5 g (5 pletter, 5 mm i diameter, eller 1 plet, 10 mm i diameter) gel pr. m<sup>2</sup>, eller påfør en enkelt tynd gelperle op til 5 cm lang pr. m<sup>2</sup>. Øg mængden i påføringerne op til 0,5 g/m<sup>2</sup> afhængigt af angrebets sværhedsgrad og den aktuelle art. Ved brug i lokkemadsstationer: Kom gel i lokkemadsstationens kammer, det giver et minimum på 0,2 g og op til 0,5 g gel m<sup>2</sup>. Øg mængden i påføringerne op til 0,5 g/m<sup>2</sup> afhængigt af angrebets sværhedsgrad. Typisk skal lokkemadsstationer efterses hver 7.-14. dag for forbrug og for evt. genopfyldning om nødvendigt.

**RISIKOREDUCERENDE FORANSTALTNINGER:** Påfør højest produktet én gang om måneden og ikke mere end 11 gange om året for at begrænse miljøforureningen.

**OPLYSNINGER OM MULIGE DIREKTE/INDIREKTE VIRKNINGER, VEJLEDNING I FØRSTEHJÆLP OG NØDFORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF MILJØET:**

#### Førstehjælp:

**Indånding:** Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller der er blevet inhaleret store mængder.

**Hudkontakt:** Fjern forurennet tøj og sko. Vask forurennet hud med sæbe og vand. Kontakt GIFTLINIEN, hvis symptomer varer ved.

**Øjenkontakt:** Skyl straks med rigeligt vand, og løft lejlighedsvis de øvre og nedre øjenlåg. Kontrollér og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres nemt. Fortsæt med at skylle med lunken vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation eller synsedsættelse.

**Indtagelse:** Skyl munden med vand. Kontakt GIFTLINIEN. Søg straks læge, hvis der opstår symptomer, og/eller der er indtaget store mængder. I tilfælde af mistet bevidsthed: Placer den berørte i stabil sideleje, og søg lægehjælp omgående. Giv ikke væske, og fremkald ikke opkastning. Sørg for, at beholderen eller etiketten er tilgængelig.

**RESISTENS:** Brug kombinerede metoder til skadedyrsbekæmpelse som fx kombinationen af kemiske og fysiske bekæmpelsesmetoder og andre foranstaltninger under hensyntagen til lokale forhold (klimatiske forhold, målarer, anvendelsesbetingelser osv.). Skift mellem produkter, der indeholder aktivstoffer med en anden virkemåde (for at fjerne resistente individer fra populationen). Brug ikke produktet i områder, hvor der er mistanke om eller påvist resistens over for det eller de aktive stoffer, der er i dette produkt. Giv registreringsindehaveren besked, hvis behandlingen er ineffektiv.

#### SPLID

Tør spildt eller overskydende produkt op med køkkenulle ved afslutningen af behandlingen og bortskaf brugt køkkenulle korrekt. Rengør spidserne efter hver behandling med køkkenulle og bortskaf brugt køkkenulle korrekt. Brug køkkenulle kan bortskaffes med dagrenovationen.

#### BORTSKAFFELSE

Restder og emballage bortskaffes som farligt affald (P501).

Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ, og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Rengør de fyldte patronrør og lokkemadstationer mellem påføringerne med køkkenulle, og bortskaf brugt køkkenulle korrekt. Genfyld eller genbrug ikke dispenseren til lokkemaden – tomme dispensere skal bortskaffes på en sikker måde og er brugerens/ejers ansvar. Udled ikke det ubrugte produkt på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter ...) eller i afløbet. Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald (lokkemadsstationer) i overensstemmelse med de lokale regler.

#### LAGRING

Beskyttes mod lys. Beskyttes mod frost.

**Holdbarhed:** 3 år

For mere information om produktet se vores hjemmeside [www.syngenta.dk](http://www.syngenta.dk)

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Advion<sup>®</sup>