

L1079407 SPAI/08Z



Talon[®] Soft XT

Rodenticida

syngenta

Rodenticida (TP 14) listo para usar. Para el control de ratones comunes (*Mus musculus*) y de ratas (*Rattus norvegicus*) en el interior y alrededor de edificaciones

Sustancia activa:

Brodifacum 0,0025% p/p (0,025 g/kg) (CAS: 56073-10-0)

Cebo (Listo para usar): pasta en tubos de 300 g.

Número de autorización: ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

Titular de la autorización: Rentokil Initial Limited

Hazel House, Millennium Park, Naas
Co Kildare, Irlanda

Comercializado por: Syngenta España S.A.

c/ Ribera del Loira, 8-10, 3ª planta – 28042 Madrid – Teléfono: 913 876 410

SOLO PARA PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas

Fecha de fabricación/No. de lote:

Contenido neto:

300 g

Los nombres de productos marcados con ®, el ALLIANCE FRAME, el Logo SYNGENTA y el PURPOSE ICON son marcas comerciales de una compañía del Grupo Syngenta



ATENCIÓN

DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas.

Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario. En caso de: Exposición dérmica, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.

Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retire las, enjuague los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.

Exposición oral, enjuague la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al **SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** (Teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota. Peligroso para la fauna salvaje.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE: Ver folleto interno.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Mantener el envase cerrado y alejado de luz.

Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.

El producto es estable durante 24 meses.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO Y OTRA INFORMACIÓN: Ver folleto interno.

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío, después de utilizar su contenido, debe ser gestionado de acuerdo con la legislación vigente.

UFI: PR2W-301G-Q00T-NWQE

Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consultar a un médico en caso de malestar.

Elimínese el contenido y/o su recipiente, toallitas de limpieza, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Se recomienda como método de tratamiento la incineración.

Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.



8 436048 326680

SU AGI Code: 68759